

Donación De Sangre Para Pacientes Con Hemocromatosis Hereditaria y Terapia de Reemplazo De Testosterona

Gracias Por Venir Hoy!

¿Que Es Hemocromatosis?

La hemocromatosis (HH) (también conocida como hemocromatosis hereditaria o primaria) es la causa principal de la enfermedad por sobrecarga de hierro. Las personas con hemocromatosis absorben cantidades adicionales de hierro de su dieta diaria. Con el tiempo, estos excesos se acumulan en los órganos principales, como el corazón, el hígado, el páncreas, las articulaciones y la pituitaria. Si no se elimina el hierro extra, estos órganos pueden enfermarse. Los donantes con hemocromatosis hereditaria requieren una extracción de sangre terapéutica regular ("flebotomía") para reducir sus niveles de hierro. La flebotomía terapéutica es igual a la donación regular de sangre, pero requiere una orden del médico (receta).

¿Que Es La Terapia De Reemplazo de Testosterona?

La terapia de reemplazo de testosterona (TT) se usa para aliviar los síntomas asociados con bajos niveles de esta hormona, bajo la supervisión de un proveedor de atención médica. A pesar de sus beneficios potenciales para las personas con síntomas, el TT también puede causar "policitemia", un aumento en la producción de glóbulos rojos que resulta en un aumento potencialmente peligroso en el grosor de la sangre ("viscosidad"). Para evitar esto, algunos proveedores requieren que los que están en TT donen sangre regularmente. Si es necesario, se utiliza la extracción de sangre terapéutica ("flebotomía") para lograr esto. La flebotomía terapéutica es igual a la donación regular de sangre, pero requiere una orden del médico (receta).

No hay cargo por flebotomía terapéutica para donantes con hemocromatosis hereditaria o reemplazo de testosterona (TT), independientemente de si mantenemos o no la unidad. Si cumple con todos los demás criterios para la donación de sangre, ¡su sangre puede usarse para salvar una vida!

Para TT, si su proveedor de atención médica le ha dicho que debe donar sangre, trabajaremos con ese proveedor para obtener una receta para que done según sea necesario.

Tenga en cuenta: **la información anterior no se aplica si está en TT, pero su proveedor de atención médica nunca le ha dicho que "tiene que", "debe" o "debe" donar sangre.** Si no es necesario que done, puede continuar como donante voluntario de sangre, con donaciones no más de cada 56 días. Discuta esta distinción con su proveedor y nuestro personal.

¡LEA ESTO ANTES DE DONAR!

Sabemos que no donaría a menos que piense que su sangre está segura. Sin embargo, para que podamos evaluar todos los riesgos que pueden afectarlo a usted o a un paciente que recibe una transfusión, es esencial que responda cada pregunta de manera completa y precisa. Si no entiende una pregunta, pregunte al personal del centro de sangre. Toda la información que proporcione es confidencial.

Para determinar si es elegible para donar, haremos lo siguiente:

- Preguntaremos sobre su salud y viajes.
- Preguntaremos sobre los medicamentos que está tomando o ha tomado.
- Preguntaremos sobre su riesgo de infecciones que pueden transmitirse por la sangre, especialmente el SIDA y la hepatitis viral.
- Tómese la presión arterial, la temperatura y el pulso.
- Tome una muestra de sangre para asegurarse de que su recuento sanguíneo sea aceptable.



Donación De Sangre Para Pacientes Con Hemocromatosis Hereditaria y Terapia de Reemplazo De Testosterona (Página 2)

Viajar o nacer en otros países

Es posible que las pruebas de donantes de sangre no estén disponibles para algunas infecciones que se encuentran solo en ciertos países. Si nació, vivió o visitó ciertos países, es posible que no sea elegible para donar.

Si es elegible para donar, nosotros:

- Limpie su brazo con un antiséptico. Díganos si tiene alguna alergia en la piel.
- Use una aguja nueva, estéril y desechable para recoger su sangre.

QUE SUCEDE DESPUÉS DE SU DONACIÓN

Para proteger a los pacientes, se analiza su sangre para detectar varios tipos de hepatitis, VIH, sífilis y otras infecciones. Si su análisis de sangre da positivo, no se le dará a un paciente. Hay momentos en que no se analiza su sangre. Si esto ocurre, es posible que no reciba ninguna notificación. Se le notificará sobre cualquier resultado positivo de la prueba que pueda descalificarlo para donar en el futuro. El centro de sangre no divulgará los resultados de su prueba sin su permiso por escrito, a menos que lo exija la ley (por ejemplo, al Departamento de Salud).

ELEGIBILIDAD DEL DONANTE - INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Ciertas enfermedades como el SIDA y la hepatitis, se pueden transmitir a través del contacto sexual e ingresar a la línea sanguínea. Le haremos preguntas específicas sobre contacto sexual.

¿Qué queremos decir con "contacto sexual"?

Las palabras "tener contacto sexual" y "sexo" se usan en algunas de las preguntas que le haremos, y se aplican a cualquiera de las actividades a continuación, ya sea que se haya utilizado o no un condón u otra protección:

- Sexo vaginal (contacto entre el pene y la vagina)
- Sexo oral (boca o lengua en la vagina, el pene o el ano de alguien)
- Sexo anal (contacto entre el pene y el ano)

Conductas de riesgo de VIH/SIDA

El VIH es el virus que causa el SIDA. Se transmite principalmente por contacto sexual con una persona infectada O al compartir agujas o jeringas usadas por una persona infectada.

No done si usted:

- Alguna vez ha tenido VIH/SIDA o alguna vez ha tenido una prueba positiva para el virus del VIH/SIDA
- Ha usado agujas para tomar cualquier medicamento no recetado por su médico EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES
- Ha tomado dinero, drogas u otro pago por sexo EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES
- Ha tenido contacto sexual EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES con cualquier persona que haya tenido VIH/SIDA o alguna vez haya tenido una prueba positiva para el virus del VIH/SIDA, haya tomado dinero, medicamentos u otro pago por sexo, o haya usado agujas para tomar cualquier medicamento no recetado por su médico
- Es un hombre que ha tenido contacto sexual con otro hombre, EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES
- Es una mujer que ha tenido contacto sexual EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES con un hombre que ha tenido contacto sexual con otro hombre EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES
- Ha tenido sífilis o gonorrea EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES
- Ha estado en detención juvenil, encierro, cárcel o prisión durante 72 horas o más consecutivas EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
- Tiene antecedentes de infección o enfermedad por el virus del Ébola.

Donación De Sangre Para Pacientes Con Hemocromatosis Hereditaria y Terapia de Reemplazo De Testosterona (Página 3)

¡No done para hacerse una prueba!

Si cree que puede estar en riesgo de contraer el VIH/SIDA o cualquier otra infección, no done simplemente para hacerse una prueba. Pregúntenos dónde puede hacerse la prueba fuera del centro de sangre.

No done si tiene estos síntomas que pueden estar presentes antes de que una prueba de VIH resulte positiva:

- Fiebre
- Ganglios linfáticos agrandados
- Dolor de garganta
- Sarpullido

Su sangre puede transmitir infecciones, incluido el VIH/SIDA, incluso si se siente bien y todas sus pruebas son normales. Esto se debe a que incluso las mejores pruebas no pueden detectar el virus durante un período de tiempo después de la infección.

INFORMACIÓN NUEVA IMPORTANTE

NO DONE si usted:

- Está tomando algún medicamento para prevenir la infección por VIH, estos medicamentos pueden ser conocidos por usted con los siguientes nombres: PrEP, PEP, TRUVADA o DESCOVY.
- Ha tomado este medicamento en los últimos 3 meses.
- **NUNCA** ha tomado algún medicamento para tratar la infección por VIH.

NO done si su donación podría dañar al paciente que recibe la transfusión.

Para hacer una donación terapéutica, comuníquese con el Coordinador de Servicios Médicos.
877-386-6874 (llamada gratuita)
909-386-6817 (fax)

Para una lista de localidades de LifeStream, visite www.LStream.org.